


Vaginit və vulvovaginit ginekoloqlara olan əsas müraciətlərdən biridir¹



SOS Qarışıq vaginit (QV) çox rast gəlinən və getdikcə ciddi terapevtik problemə çevrilən patologiyadır³

Vaginit əlamətləri ilə müraciət edən qadınların **>90%**-də anamnezdə uzunmüddətli residivləşən BV və VVK olub³

BV-lu qadınların **20-30%**-də *Candida*, **60-80%**-də *T.vaginalis* koinfeksiyası aşkarlanır⁴

Pasiyentlərin şikayətləri:

uşaqlıq yolu və vulva nahiyəsində

göynəmə, yanma hissi

qıcıqlanma, ağrı, qaşınma

dizuriya, disparyuniya, patoloji ifrazat



Qarışıq infeksiyon vaginitlərin müalicəsi üzrə tövsiyələr^{5,6}

- etioji rəngarənglik (*bakterial*, *göbələk*, *trixomonada* və s.)
- çoxsaylı patogenlər, koinfeksiyalar
- tez-tez rast gəlinən diaqnostik anlaşılmazlıqlar

EMPIRİK MÜALİCƏ

ANTİBAKTERİAL • ANTİFUNQAL • TRIXOMONASİD
kompleks preparat

**yüksək effektivlik
və təhlükəsizlik**

QV müalicəsi üçün antibakterial preparat⁷

BAKTERİSİD
effektli olmalı⁷

-vaginal və rektal şərti-patogen flora
-piogen flora
-bağrsaqa mənşəli bakteriyalar⁷

FemiNES

vaginal şam №10

Trichomonas vaginalis
Bacteroids spp.
Mobiluncus spp.
Peptostreptococcus spp.

Metronidazol

Nistatin

maya və mayaya bənzər göbəklər:
Candida albicans
Candida glabrata
Candida kruzei

qrammənfi və qrammüsbət bakteriyalar:
Staphylococcus spp., *Streptococcus spp.*,
Escherichia coli, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*,
Proteus spp., *Enterobacter aerogenes*

Neomisin sulfat

Hidrokortizon

iltihabəleyhinə
qaşınma əleyhinə
ağrıkəsici



Nistatin qüvvətli funqisid və funqistatik təsir göstərir⁸

Vulvovaginal kandidoz zamanı effektivliyi **>80%**⁹



Intravaginal təyin olunan hidrokortizon pasiyentlərdə ağrının və digər əlamətlərin aradan qalxmasına və tam yüngülləşməyə səbəb olur!¹⁰

FemiNES

qarışıq infeksiyon vaginitli qadınlarda...

- geniş spektrli antibakterial, antiprotozo, antifunqal təsir göstərir
- etioji və simptomatik təsir göstərir
- simptomları sürətli və əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirir
- qaşınma və yanma hissini ən qısa müddət ərzində aradan qaldırır
- pasiyent məmnuniyyətini təmin edir

1 vaginal şamın tərkibində

- Metronidazol500 mq
- Neomisin sulfat100 mq
- Nistatin100000 BV
- Hidrokortizon asetat5 mq

İstifadəsinə göstərişlər

- ✓ **Bakterial vaginitlər (anaerob vaginozlar)**
- ✓ **Trichomonad vaginiti**
- ✓ **Vaginal və ya vulvovaginal kandidozlar**
- ✓ **Trichomonas vaginalis, göbələklər və/və ya bakteriyalar tərəfindən yaranan qarışıq vaginal infeksiyalar.**
- ✓ **Vaginada və vulvada qaşınma və yanma hissi ilə müşayiət olunan leykorreya (xüs. kandidoz və ya bakterial infeksiyaya şübhə olduqda)**
- ✓ **İkincili infeksiyalaşmanın profilaktikası məqsədilə:**
 - Ginekoloji üzvlərin xəstəliklərinin cərrahi müalicəsindən, doğuş və ya abortdan, uşaqlıqdaxili müayinələrdən (histeroskopiya) öncə
 - Uşaqlıqdaxili spiralın yeridilməsindən öncə və ya sonra
 - Uşaqlıq boynunun diatermokoaqulyasiyasından öncə və ya sonra

İstifadə qaydası və dozası

Gündə 1-2 dəfə, ardıcıl 5-10 gün ərzində vaginanın dərinliyinə daxil edilməlidir.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Femines vaginal şamlarının tərkibi protozoal və ya mikrob infeksiyaları ilə əlaqəli vaginal və ya vulvovaginal iltihab xəstəliklərinin müalicəsində eyni zamanda təsir göstərmələri üçün hazırlanmış dörd aktiv komponentdən ibarətdir. Metronidazol, *Trichomonas vaginalis* kimi vaginal protozoal infeksiyaların profilaktikası və müalicəsi üçün effektiv bir vasitədir. O həmçinin *Bacteroids* spp., *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp. və *Peptostreptococcus* spp. kimi bir çox anaerob mikroorqanizmlərə qarşı bakterisid təsir göstərir. Neomisin, müxtəlif qrammənfi və qrammüsbət bakteriyaların çoxuna qarşı yüksək effektiv və təsdiq edilmiş bakterisid təsiri ilə məlum olan aminoqlikozid antibiotikdir. Nistatin, *Candida* növləri də daxil olmaqla, maya və mayaya bənzər göbələklərin çoxuna qarşı fungistatik təsiri ilə məlum olan antifungal (göbələkəleyhinə) antibiotikdir. Hidrokortizon, minimal əlavə təsirlərə malik olan və tez təsiri antiallergik, qaşınmaəleyhinə və iltihabəleyhinə təsir göstərən bir kortikosteroiddir. Vaginal şamlar formasında Femines preparatı infeksiyalar zamanı müşahidə edilən qaşınma və yanma hissini sürətli simptomatik yüngülləşdirmə üstünlüyünə malikdir. Buna görə də, Femines geniş terapevtik təsirləri, eləcə də pasiyent məmnuniyyətini təmin edir. Bundan əlavə, vaginal şamlar formasındada Femines preparatı inqredientlərinin zəif sistem absorpsiyası ilə vaginada lokal olaraq təsir etməsi səbəbindən olduqca təhlükəsizdir. Femines vaginal şamları minimum sistem absorpsiyası ilə yerli olaraq təsir göstərir.

Əks göstərişlər. Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri. Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri. Əlavə təsirləri.

"İstifadəsi üçün təlimatına" baxın. **Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi:** istifadəsi tövsiyə edilmir.

Buraxılış forması: 5 vaginal şam. **İstehsalçı:** Faraonia Farmaseyitkals (Faro Farma).

Ədəbiyyat:

- Chemen MN, et al. Noncandidal vaginitis: a comprehensive approach to diagnosis and management. Am J Obstet Gynecol. 2020 Feb;222(2):114-122.
- Lopez EM, et al. Candidiasis (vulvovaginal). BMJ Clin Evid. 2015; 2015: 0815.
- Benyas D, et al. Mixed Vaginitis Due to Bacterial Vaginosis and Candidiasis. J Low Genit Tract Dis. 2022 Jan 1;26(1):68-70.
- Sobel JD, et al. Mixed vaginitis-more than coinfection and with therapeutic implications. Curr Infect Dis Rep. 2013 Apr;15(2):104-8.
- Bohbot JM, et al. Nystatin-Neomycin-Polymyxin B Combination: Efficacy and Tolerance as 1st-Line Local Treatment of Infectious Vaginitis. Open Journal of Obstetrics and Gynecology. Vol.4No.7.May 2014
- Bohbot JM, et al. PRISM study: Comparison of a nystatin-neomycin-polymyxin B combination with miconazole for the empirical treatment of infectious vaginitis. Med Mal Infect. 2019 May;49(3):194-201.
- Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей женщин. Российское общество акушеров-гинекологов. Москва 2019. [Internet] minzdrav.mirdural.ru/uploads/19.pdf
- Obiero J, et al. Nifuratel- Nystatin combination for the treatment of mixed infections of bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, and trichomonal vaginitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr; 2018(4): CD013012.
- Mending W, et al. Mycoses. 2015 Mar;58 Suppl 1:1-15. Guideline: vulvovaginal candidosis (AWMF 015/072). S2k (excluding chronic mucocutaneous candidosis)
- Thomson JC, et al. Chronic inflammation of the vagina: treatment and relationship to autoimmunity. J Reprod Med. 2005 Jul;50(7):513-23.

FemiNES

vaginal şam №10



FemiNES

Metronidazole+Neomycin Sulfate+Nystatin+Hydrocortisone
vaginal şam №10

