

# Ceftem 1g

III nəsıl sefalosporin

Seftazidim



## İnfeksiyaların qalibi

# CEFTEM 1g

seftazidim toz (1 flakon)  
10 ml inyeksiya üçün su

**Geniş antimikrob təsir spektri**  
*N. meningitis, H. Influenzae, Enterobacteriaceae spp.*  
daxil olmaqla bir çox qram (+), qram (-) və anaerob bakteriyalara qarşı aktivlik



***Ps. aeruginosa*-nın rezistent ştammlarına qarşı həssaslıq**

## SÜRƏTLİ TƏSİR VƏ YÜKSƏK KLİNİKİ NƏTİCƏ

- ✓ YT və AT yollarının infeksiyaları
- ✓ Ginekoloji infeksiyalar
- ✓ Həzm traktının infeksiyaları
- ✓ Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları
- ✓ Sümük və oynaqların infeksiyaları



- ✓ İnteraabdominal infeksiyalar
- ✓ İnfeksiyalaşmış yanıqlar
- ✓ Hemodializ nəticəsində yaranan infeksiyalar
- ✓ Bakterial meningit
- ✓ Septisemiya

**12 yaşdan yuxarı yeniyetmələr və böyüklər**

**Əksər infeksiyalar zamanı:** 1 q X 2 dəfə

**Çox ağır infeksiyalar zamanı:** 2 q X 2-3 dəfə



### SÇY infeksiyaları


500 mq - 1 q  
hər 12 saatdan bir

**Prostat vəzin transuretral rezeksiyası zamanı infeksiyon fəsadların profilaktikası**



### Kistoz fibroz xəstələrində bronx-ağciyər infeksiyaları

100-150 mq/kq/günə  
hər 8 saatdan bir



1 q anesteziyanın induksiyasında  
2-ci doza kateterin xaric edilməsi zamanı

## CEFTEM *Pediatriyada*

### Körpələr (0-2 ay)

25-60 mq/kq/günə  
hər 12 saatdan bir



### Uşaqlar (2 ay-12 yaş)

100-150 mq/kq/günə  
hər 12 saatdan bir



### İnyeksiya məhlulünün hazırlanması

Flakon	İnyeksiya	Həllədicinin miqdarı (ml)
1 q	əzələdaxili	3 ml
1 q	venadaxili	10 ml



\*Ə/D yeridilmə zamanı həllədicini kimi inyeksiya üçün su, 0.5% və ya 1%-li lidokain məhlulu istifadə oluna bilər

\*\*V/D yeridilmə zamanı həllədicini kimi inyeksiya üçün su istifadə olunur

İstehsalçı: Makcur Laboratories Ltd

